



Tolije bahenní (*Parnassia palustris*) je na našem území jediným zástupcem čeledě a rodu s asi 40 druhy rozšířenými v mírných až chladných pásmech severní polokoule. Vyrvalá nižší bylina s přízemní listovou růžicí, tvořící několik přímých lodyh s jedním lodyžním listem, upoutává pozornost svými pětičetnými bělostnými květy, které asi nejvíce přispěly k tomu, že se stala Rostlinou roku 2010. Ve Žďárských vrších je charakteristickým druhem přírodě blízkých vlhkých prameništích a rašelinných luk. V důsledku dřívějšího odvodňování zemědělských půd došlo k úbytku jejích lokalit, dosud však v oblasti rozkvétá jako ozdobný symbol pozdního léta roztroušeně v menších populacích, k jejichž podpoře je prováděno šetrné ruční kosení luk s vyklizením a odvozem hmoty.

Meandry Svratky u Milov

Horní tok Svratky sevřený rulovými hřbety svrateckého krystalinika vytvořil v prostoru Milovské kotliny denudaci měkkých svorových hornin širokou údolní nivu s ojediněle zachovaným systémem říčních meandrů. Meandrující tok a mokřady lemuje vegetace údolních jasanovo-olšových luhů a vrbín s olší lepkavou, vrbou křehkou, trojmužnou a popelavou.

*Texty Vladimír Zabloudil
Fotografie Bohumil Hanus*

Titulní fotografie: *Malinská skála je geomorfologicky cenným dokladem projevů kryogenní modelace (tzv. mrazového zvětrávání) nejvyšších rulových hřbetů centrální části Žďárských vrchů. Tyto skalní útvary byly vypreparovány z pruhu migmatitických a biotitických rul svrateckého krystalinika ve starších čtvrtohorách.*

Snímek Bohumil Hanus